

ปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะกลืนลำบากในผู้สูงอายุ
ที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยพัฒนารมณ์

คณะผู้วิจัย

นางพัชรีกรณ์	ชนกวนิศา
นางสุจินดา	ศรีสุวรรณ
นางสาวอมอร์	คำภักดี
นางจรรยา	คนใหม่

วิทยาลัยพยาบาลรามราชนี ขอนแก่น
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา เพื่อศึกษาภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ในผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง และปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ในผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง โดยใช้กรอบแนวคิดที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม

กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) เพศหญิงจำนวน 118 คนที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ในขณะเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง โรงพยาบาลสุขุมวิท ในช่วงวันที่ ๑ กรกฏาคม ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์ที่คัด粫ผู้วิจัยบ้านมาผลการวิจัยเรื่องภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ในผู้สูงอายุหญิงที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ที่ศึกษาโดยพัชริกาญ์ พุสกุล (๒๕๔๘) จำนวน ๔ ชุด ชุดที่ ๑ แบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไป ชุดที่ ๒ แบบคัดกรองเบื้องต้น ชุดที่ ๓ แบบสัมภาษณ์ปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ในผู้สูงอายุหญิงที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และชุดที่ ๔ แบบวัดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุไทย เครื่องมือได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ๓ ท่าน โดยแบบสัมภาษณ์ชุดที่ ๓ และ ๔ หาค่าความเที่ยงได้เท่ากัน ๐.๗๖ และ ๐.๗๔ ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมสำหรับ SPSS/PC ด้วยการแยกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

- ผู้สูงอายุมีภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ในขณะเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง ร้อยละ 22.88 ปริมาณปัสสาวะที่กลั้นไม่อยู่แต่ละครั้งมากที่สุดคือ ปริมาณปานกลาง ร้อยละ 77.8 และความน้อยของอาการเกิดอาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่มากที่สุดคือ บ่อยมากร้อยละ 70.4

- ปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ในผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิงเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยได้แก่ แบบแผนการขับถ่ายปัสสาวะ การมีชีดจำกัดหรืออุดกั้นกัดกิจกรรม ค่าดัชนีมวลกาย ตั้งเวลาล้อลมไม่เหมาะสม อายุ ชาที่ได้รับ การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ ภาวะท้องผูก โรคหรือความเจ็บป่วย การผ่าตัด ภาวะซึมเศร้า ภาวะสับสน เสียงพลัน และการได้รับรังสีรักษา

การเกิดภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ในผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง นับว่าเป็นปัญหาที่ควรให้ความสนใจ เพื่อให้ผู้สูงอายุและครอบครัวมีความรู้ และทัศนคติที่ถูกต้อง เกี่ยวกับภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ ตลอดจนทึมสุขภาพและบุคลากรจะระหนักรึงปัญหาการเกิดภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ในโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นร่วมกับการเจ็บป่วยอื่นๆ